Babiasca niagra

Vass4R15s496-500

Collection Vassal-Montpellier

1226Mtp3

E Richer Mingra

III 6 S7 Bahasca magra







Babiatea magra 1886

SICH XII MANOR 6 and 5 south 7

Villent 22

Plat (623) - 1 drig - conchi

Willer min 0 . 0

Dato de Vérnison : 2-8

Dato de Vérnison : 2-8

Bata de Vérnison : 2-8

Chille : 00 - 0 - 117

alco. - 011 - 01. -

Baliasea niagra DESIGNATION : CLOS XII PLANCHE 6 RANG \$ Souche 7 Vigueur : 2,5 PORT : Frig - 1 érig - couché Hillsrandage: 0,5 Date de Véraison: 10.8.78 Date de Naturité : 11 · 9.78 Pourriture : 0 GRAPPE : G-RI-P: L-F-C BAID : TG - G - M - P 15 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (II) SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : \$29 \$3 **2** \$4 **6** \$5 **9** avec pépins - apyrène JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION: Babiasea magra CLOSVIT PLANCHE 6 RANG S Souche 7 . Vigueur : 1 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 3-8-79 Date de Naturité : 5.9.79 Pourriture : 0 13 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - 10 - P 18 disc. - (Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépina - apyrène JUS : inc. - coloré

Année : 1975 XII- 657 Emplacement .. ! Nombre ! Total d'yeux! : 6.3 1173 11013 113.3

Année : 1976 Emplacement XII 6 57 . Désignation / Babiasca magra ! Nombre ! Total d'yeux! 122 -3 2 x D le 22 3.76

Année: 1377
Emplacement ... XII. 687..... Désignation / Babiasea miagna

! Nombre ! Total		DATES							
! d'ye	ux! 3 -3 !	!	!	. !	!	B4 1446 0440			
1 \ 0 !	!!!	Į.	!	!	‡ *				
2/1	i i	i		!	1				
0!	!!!	!	!	!	!				
3 : 4	2	!	!		!				
i	1 1		:	:	†				
4 10 1	i i	i	,	i	i				
5 //!	i i	i	i	į	1				
2//!	1 1	1	!	1	1				
		Dle 3-3		2					

91	Nombre Total	DATES						
!	d'yeux	13 .3	!	!	!	<u>-</u>		
11 !		!	!	!	!	i		
2/6 !		1	!	!	!	1		
!		1 8 1	1	i	•	i		
3!	3		!	!	!	1		
;			!	!	!	!		
4		;	1	:	!	!		
5 6!	!	i	i	i	i	į		
	1	1	t	1	1	,		

+21

lantanlanti

dantankantanlantankantaal

Désignation : Emplacement : . Babiasea miagra

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)- duveteux 8 cotonnoux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetouses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées (7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calus 74

nlantoolootooloidiidiidadaalootool

Désignation : Emplacement : Babiasca miagra

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. ontièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

elandan kada glundan kada d

Babiasca niagra

Désignation : Emplacement :

lontoulouti

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - petite 1 - noyenne (2) - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranécux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux (5) - velouté 6 -35 aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 8 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 37 -

Norvures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge particllement rouge (3)- entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 -

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

anglo pétiolo/limbo : infóricur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

4

luntminuti

Babiasea miagra

GRAPPE

24 - Grosse (Moyenno 2 - Petite 3.

18

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 90

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde O - sphéroïde O - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7: quel pipis (8)

31 - A pédicelle long (1) - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de coulcur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - pou apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

```
Baliasea niagra
DEHOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 6574-3
                                         SARHENT DE VIGNE
                             : long (1), moyon (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                               autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtolée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

contièrement (1), partiellement (2), sur les nocads (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cas.
                              : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                              : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beigo (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

9 - L₁/L ① - (2) - 3. 10 - L2/L (1 - 2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5)-(7)- 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3, 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3/ 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 3 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KA L'₃ 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Domergne 79

dantankanjyahatiakatial

Babiasca miagra
XII. 657 s-3

Désignation : Emplacement :

01 14

hantanhaata

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies @ - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies Ø - vert 3. 51 - noouds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. il la base : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 6 jarfois 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.